



HÄNDE- / HAUT-
DESINFEKTIONSMITTEL

AHD 2000®

Alkoholisches Hände- und
Haut-Desinfektionsmittel

Désinfectant alcoolisé
pour les mains et la peau



FACHINFORMATION

AHD 2000®

Gebrauchsfertig

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 79,9 g Ethanol 96%; *Sonstige Bestandteile:* Butan-2-on, Macrogolglycerolcocoate, Geruchsstoffe, Milchsäure, Gereinigtes Wasser.

Darreichungsform: Lösung zur Anwendung auf der Haut

Anwendungsgebiete: Chirurgische Händedesinfektion. Hygienische Händedesinfektion. Hautdesinfektion von unverletzter Haut.

Dosierung/Art der Anwendung: Äußerlich unverdünnt anwenden!

Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, begrenzt viruzid* (inkl. HBV/HCV/HIV), Rotavirus, Adenovirus: 30 sek.**

* gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004.

Hygienische Hände-Desinfektion: konz. 30 sek.

Chirurgische Hände-Desinfektion: konz. 1,5 min.

Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.

Haut-Desinfektion: Anwendung *an talgdrüsenarmer Haut:* vor Punktion und Injektion – konz. mind. 15 sec.; vor Punktion von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen, sowie vor operativen Eingriffen: konz. mind. 1 min.; Anwendung *an talgdrüsenreicher Haut:* vor allen Eingriffen: konz. mind. 1 min.

Zur Anwendung von AHD 2000® bei **Kindern** liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Bei Säuglingen und Kleinkindern nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden. Bei sachgemäßer Anwendung sind jedoch keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit: Bei sachgemäßem Gebrauch kann AHD 2000® während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen(Rötung, Brennen) kommen. Allergische Reaktionen sind sehr selten: (<0,01 % oder unbekannt). Zur Vorbeugung einer Entfettung der Haut empfiehlt es sich nach der Arbeit und in den Arbeitspausen die Hände einzucremen. Bei stärkeren Hautirritationen bitte einen Arzt aufsuchen!

Überdosierung / Anwendungsfehler:

Nicht in **offenen** Wunden und auf Schleimhäuten anwenden. Falls das Präparat in Kontakt mit Schleimhäuten (z.B. **Augen**, Rachen, Magen, etc.) oder offenen Wunden gekommen ist, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Falls AHD 2000® **eingegenommen** worden ist: zur Verdünnung des Präparates sofort reichlich Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen!

Pharmakotherapeutische Gruppe:

ATC-Code: D08.

Pharmazeutische Angaben:

Haltbarkeit:

Haltbarkeit (auch nach Anbruch des Behältnisses): 36 Monate. Stets Kennzeichnung des Behältnisses beachten!

Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen:

Arzneimittel nicht über 25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden! Flammpunkt nach DIN 51 755: 19°C. Nicht in offene Flamme sprühen. Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu entsorgen!

Art und Inhalt des Behältnisses:

HDPE-Behältnisse

Packungsgrösse: 125 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 5 Liter

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller/Inhaber der Zulassung

Firma Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133
12247 Berlin Tel. 030-77 99 2-0, Telefax 030-77 99 269.

Zulassungsnummer:

Zul.-Nr.: 6339804.00.00 erteilt am 22.07.2004

Stand der Information:

Oktober 2009