



LIEFERFORM UND PACKUNGSGRÖSSE

1 Liter Euroflasche

VE: 10 x 1 Liter Art.-Nr. 20530

1 Liter V10 Spenderflasche

VE: 6 x 1.000 ml Art.-Nr. 20535

500 ml Euroflasche

VE: 20 x 500 ml

Art.-Nr. 20529

150 ml Kittelflasche

VE: 20 x 150 ml Art.-Nr. 20533

SeptoDerm Hände ist nach EG-Richtlinien und GefStoffV als Fertigarzneimittel nicht kennzeichnungspflichtig

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ZUBEHÖR

V10 Wandspender

für 1.000 ml Spenderflasche Art.-Nr. 80044

Abtropfschale für V10 Wandspender

Art.-Nr. 80038

Edelstahlbügel für V10 Wandspender

Art.-Nr. 80040

Wandspender

für 1 Liter und 500 ml Euroflasche Art.-Nr. 80054

Handdispenser

für 1 Liter und 500 ml Euroflasche Art.-Nr. 94787

Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer

Dr. Schumacher GmbH Am Roggenfeld 3 D-34323 Malsfeld

Mitvertreiber

DR.SCHNELL Chemie GmbH Taunusstraße 19 D-80807 München

06/2012

SeptoDerm Hände





Gebrauchsfertiges, alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut

ANWENDUNGSGEBIETE

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen wie Kliniken, Heimen, Praxen, in der Industrie und in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für alle Bereiche wie OP, Intensivstationen, Infektionsabteilungen, Pflegestationen, Reinräume, Produktion, etc.

ANWENDUNG

Zum Einreiben in die trockenen Hände.

| Anwendungsgebiet | Dosierung/Einwirkzeit | Anmerkung |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Hygienische Händedesinfektion | konzentriert 30 Sek. | gem. VAH/DGHM, EN 1500 |
| Chirurgische Händedesinfektion | konzentriert 1,5 Min. | gem. VAH/DGHM, EN 12791 |
| Bakterizid inkl. MRSA, levurozid | konzentriert 30 Sek. | gem. VAH/DGHM |
| Tuberkulose (M. terrae) | konzentriert 1 Min. | |
| Begrenzte Viruzidie (behüllte Viren z. B. HBV/ HIV/ HCV/ Vakzinia/BVDV) | konzentriert 15 Sek.* | gem. RKI Empfehlung 1/2004 |
| Rotaviren | konzentriert 15 Sek.* | |
| Noroviren (MNV) | konzentriert 1 Min. | gem. EN 14476 |
| Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Produkt feucht gehalten werden. | | |
| * Für die hygienische Händedesinfektion ist mindestens eine Finwirkzeit von 30 Sekunden einzuhalten | | |

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- VAH- und RKI-gelistet Bereich A (gemäß IfSG § 18)
- Frei von Aldehyden, Phenolen, QAVs
- Sporenfrei gefiltert
- Enthält rückfettende Hautpflegekomponenten
- Hervorragende Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern
- Mit allen Waschlotionen kompatibel

BESONDERE HINWEISE

Alkoholhaltig, entzündlich. Flammpunkt: 23 °C. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Elektrische Geräte erst nach Auftrocknung benutzen. Nicht mehr als 50 ml pro m² ausbringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Symptome bei Verschlucken größerer Mengen:

Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft; in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

NERENWIRKIINGEN

Alkoholische Händedesinfektionsmittel und Wollwachs können zu lokalen Unverträglichkeitsreaktionen führen.

WECHSELWIRKUNGEN

Keine bekannt.

GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile:

63,14 g 2-Propanol

Sonstige Bestandteile: 1, 3-Butandiol, Lanolin-poly(oxyethylen)-xx, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Enthält Wollwachs.

Zugelassen nach AMG in der Bundesrepublik Deutschland – Zul.-Nr. 34988.00.00.

Stand der Information: 06/2012

