

Muster		Tätowierer u. Piercer 1.0		Stand: Dezember 2021
Was?	Wann?	Womit?		Wie?
Maßnahme	Häufigkeit	Produkt	EWZ / Konz.	Durchführung
 Hygienische Händedesinfektion	VOR Arbeits-/Dienstbeginn. NACH Toilettenbesuch und Pausen. Kontakt mit Mensch und Materialien. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien. Auch vor bzw. nach Benutzung von Handschuhen!	Sterillium med	30 Sek. gebrauchsfertig	Präparat in die trockene, hohle Hand geben, über die gesamte EWZ bis zu den Handgelenken einreiben und feucht halten.
 Hygienische Händedesinfektion	VOR Arbeits-/Dienstbeginn. NACH Toilettenbesuch und Pausen. Kontakt mit Mensch und Materialien. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien. Auch vor bzw. nach Benutzung von Handschuhen!	Sterillium classic pure	30 Sek. gebrauchsfertig	Präparat in die trockene, hohle Hand geben, über die gesamte EWZ bis zu den Handgelenken einreiben und feucht halten.
 Händewaschung	Vor Arbeitsbeginn. Nach Toilettenbesuch. Bei Verschmutzung.	Baktolin Pure	gebrauchsfertig	Hände anfeuchten, Produkt entnehmen, aufschäumen, gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 Hautpflege	Nach hautbelastender Tätigkeit. In Pausen. Nach Arbeitsende.	Baktolan Protect+ Pure	gebrauchsfertig	Auf Handrücken geben, gleichmäßig einmassieren. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 Hautschutz	Vor Arbeitsbeginn, hautbelastenden Tätigkeiten. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Einmalhandschuhe!	Baktolan Protect+ Pure	gebrauchsfertig	Auf Handrücken geben, gleichmäßig einmassieren. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 Handschuhe unsteril	Je nach Arbeitsbereich: allergenarme, möglichst ungepuderte, flüssigkeits- bzw. chemikaliendichte Schutzhandschuhe verwenden. Bei möglichem Kontakt mit erregerehaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen). Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungslösungen (Achtung: Handschuhstulpen umschlagen!). Bei Umgang mit Lebensmitteln.	Peha-Soft Nitrile Fino		Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
 Handschuhe steril	Je nach Arbeitsbereich: allergenarme, möglichst ungepuderte, flüssigkeits- bzw. chemikaliendichte Schutzhandschuhe verwenden. Bei möglichem Kontakt mit erregerehaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen). Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungslösungen (Achtung: Handschuhstulpen umschlagen!). Bei Umgang mit Lebensmitteln.	Peha-soft nitrile sterile		Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
 Kopf und Mundschutz	Nach Gebrauch.	Foliodress mask		Nach Gebrauch in Abfallbehälter entsorgen.
 Hautantiseptik	Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen an talgdrüsenarmer Haut.	Cutasept F	mind. 1 Min. gebrauchsfertig	Hautareal satt benetzen und über EWZ feucht halten.
 Hautantiseptik	Vor allen Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut.	Cutasept F	mind. 2 Min. gebrauchsfertig	Hautareal satt benetzen und über EWZ feucht halten.

Muster		Tätowierer u. Piercer 1.0		Stand: Dezember 2021
Was?	Wann?	Womit?		Wie?
Maßnahme	Häufigkeit	Produkt	EWZ / Konz.	Durchführung

 Pflegeutensilien	Bei Wechsel. Nach Kontamination.	Bacillol AF	30 Sek. gebrauchsfertig	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Pflegeutensilien	Bei Wechsel. Nach Kontamination.	Mikrobac forte	1 Std. 0.50%	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Instrumentenaufbereitung	Nach jedem Gebrauch.	Bodedex forte	0,50%	Vorreinigung. Nachspülen mit klarem Trinkwasser.
 Instrumentenaufbereitung	Nach jedem Gebrauch.	Korsolex basic	15 Min. 1,50%	Instrumente in Wanne einlegen. Einwirkzeit und Konzentration beachten.
 Fläche allgemein	Bei Wechsel. Nach Kontamination.	Bacillol 30 Tissues	30 Sek. gebrauchsfertig	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Fläche allgemein	Bei Wechsel. Nach Kontamination.	Mikrobac forte	1 Std. 0.50%	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Oberfläche Sanitärbereich	Täglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	Bacillol 30 Tissues	30 Sek. gebrauchsfertig	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Oberfläche Sanitärbereich	Täglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	Mikrobac forte	1 Std. 0.50%	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Fußboden	Täglich. Nach Kontamination.	Mikrobac forte	1 Std. 0.50%	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Wäsche	Nach Gebrauch. Mindestens täglich. Nach Kontamination.	Wäscherei		Wäscheaufbereitung zuführen.
 Berufskleidung	Nach Gebrauch. Mindestens täglich. Nach Kontamination.	Wäscherei		Wäscheaufbereitung zuführen.

Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Reinigungsberater / Paul Hartmann AG		